



## Données du Réseau Allergo Vigilance : 139 cas d'anaphylaxies alimentaires enregistrées en 2007

Tableau 3. Points spécifiques et prise en charge des cas d'anaphylaxie alimentaire

	2007
<b>SAMU et/ou Admission service des Urgences (SAU)</b>	<b>92 (66.2%)</b>
<b>Usage de l'adrénaline</b>	<b>43 (dont 5 auto injections) (30.9%)</b>
<b>Hospitalisation</b>	<b>50 (36%)</b>
<b>Facteurs associés :</b>	
Effort	18 (12.9%)
Alcool	14 (10.1%)
Aspirine, AINS	6 (4.3%)
Bêta Bloqueurs	4 (2.9%)
Daphoside*	1 (0.7%)
Flixotide	1 (0.7%)
<b>Consommation d'un allergène masqué</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Allergènes étiquetés :</b> Arachide : 6, protéine de lait : 1, œuf : 1,</li> <li>- <b>Non déclarés ou non étiquetés en 2007:</b> Lait de chèvre ou brebis : 2, isolats et hydrolysats de protéines de blé : 1, lupin : 1</li> </ul>

\*Daphoside : composé de polysaccharides de haut poids moléculaire, extrait de rhizome de *Daphne gnidium* (Thymeleacées) : plante africaine.